

Reproduzierbare Ergebnisse zur Schmerzlinderung¹⁻⁸

Veränderung der WOMAC-Schmerz-Subskala gegenüber dem Ausgangswert in allen Studien¹⁻⁸



† WOMAC oder The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index ist ein Maß für Symptome und körperliche Behinderung. LSMittelwerte sind modellierte/geschätzte Mittelwerte. Die geschätzten Mittelwerte basieren auf Daten aus anderen Besuchen und Kovariaten. **Die minimale klinisch wichtige Differenz (MCID) stellt den kleinstmöglichen Vorteil einer neuen Therapie dar, der von Patient wertgeschätzt wird.



Quellen:

1. Henriksen, M., et al. (2018). Intra-articular 2.5% polyacrylamide hydrogel for the treatment of knee osteoarthritis: an observational proof-of-concept cohort study. *Clin Exp Rheumatol*. Vol 36(6):1082-85. Epub 2018 Jul 18. PMID: 30148430.
2. Bliddal, H., et al. (2021) Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: A 6 Months Prospective Study. *J Orthop Res Ther*. Vol 6 (2): 1188. ISSN 2575-8241.
3. Bliddal, H., et al. (2021). Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results of a 52 Week Prospective Study. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 29: S278.
4. Bliddal, H., et al. (2022). A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 2 Years After Treatment. Poster presented at OARSI 2022. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 30(1): S371-S372.
5. Bliddal, H., et al. (2023) A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 3 Years After Treatment. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 31(5): 682-683.
6. Bliddal, H., et al. (2022). One-year performance of polyacrylamide hydrogel vs. hyaluronic acid: A randomised controlled study. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 30: S1, S371.
7. Bliddal, H., et al. (2024) 3 year follow-up from a randomized controlled trial of intra-articular polyacrylamide hydrogel injection in subjects with knee osteoarthritis. Poster LB-31, OARSI 2024 World Congress on Osteoarthritis.
8. Bliddal, H., et al. (2024) A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 4 Years After Treatment. Presented at EORS 2024, Aalborg and Orthopaedic Proceedings of the Bone & Joint Journal.

OUS/ARTHRO/SEP2024/164 DE

Nur für HCPs

Ausführliche Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen sowie die Gebrauchsanweisung erhalten Sie auf
hcp.arthrosamid.com/de oder indem Sie uns unter enquiries@arthrosamid.com kontaktieren.